SyrSpend® SF Πίνακας συμβατότητας









Δραστικό συστατικό (API)	Βασικές συγκεντρώσεις	Φυσική και χημική σταθερότητα (ημέρες)	Αποθήκευση	Φυσική και χημική σταθερότητα (ημέρες)	Φυσική και χημική σταθερότητα (ημέρες)	Αποθήκευση
SyrSpend® SF PH4 (Παχύρευστο υγρό) (ΜΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ)				**SyrSpend® SF PH4 NEO (Ξηρή σκόνη) (ΗΠΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ)**	**SyrSpend® SF PH4 (Ξηρή σκόνη) (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ)**	**SyrSpend® SF ALKA (Ξηρή σκόνη) (ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ)**
Acetaminophen (paracetamol)[21]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Acetazolamide[21]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Allopurinol[16]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Alprazolam[20]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Amiodarone HCl[1]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Amitriptyline HCl[16]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Amlodipine (besylate)[2]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Atenolol[3]	1 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Atropine sulfate[20]	0.1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Azathioprine[29]	50 mg / mL	14	2 8	✓	○	2
Baclofen[21, 28]	2 mg / mL	90	2	✓	○	2
	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Caffeine[17]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Captopril[4]	0.8 mg / mL	14	2	✓	○	2
Carbamazepine[16]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Carvedilol[16, 28]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	5 mg / mL	90	2	✓	○	2
Celecoxib (capsules)[22]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Chloral hydrate[22]	100 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Chloroquine phosphate[2]	15 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Cholecalciferol (vit. D3)[5]	50,000 IU / mL	90	2 8	✓	○	2
Ciprofloxacin HCl[22]	50 mg / mL	90 / 60	2 8	✓	○	2
Clomipramine HCl[17]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Clonazepam[3]	0.2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Clonidine HCl[29]	0.1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Clopidogrel (as bisulfate, tablets)[29]	5 mg / mL	30	2	✓	○	2
Cloxacilline (capsules)*. [23]	50 mg / mL	5	2	✓	○	2
Clozapine (tablets)	25 mg / mL	90 / 60	2 8	✓	○	2
Dapsone[2]	2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Darunavir & cobicistat (tablets)*.[30]	20 / 3.75 mg / mL	7	2	✓	○	2
Dexamethasone[3]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Diclofenac sodium[3]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Diltiazem HCl[3]	12 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Dipyridamole[21]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Domperidone[16]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Doxycycline[31]	2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Enalapril maleate[3]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Esomeprazole magnesium[18]	3 mg / mL	○	8	○	60	2
Ethambutol 2 HCl (tablets)[29]	50 mg / mL	30	2	✓	○	2
Ethambutol 2 HCl[29]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	100 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Flecainide acetate (tablets)[22]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Fluoxetine HCl[31]	2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Folic acid[31]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Furosemide[1]	10 mg / mL	○	8	○	14	2
Gabapentin[6]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Glutamine[20]	250 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Glycopyrrolate (glycopyrronium bromide)[22]	0.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Griseofulvin[29]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Haloperidol[5]	0.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Hydralazine HCl[29]	4 mg / mL	30	2 8	✓	○	2
Hydrochlorothiazide[17, 28]	2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	5 mg / mL	90	2	✓	○	2
Hydrocortisone[22]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Hydrocortisone hemisuccinate[1]	2 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Hydrocortisone sodium phosphate[1]	2 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Hydroxychloroquine sulfate***	25 mg / mL	90	8	○	○	○
	50 mg / mL	90	8	○	○	○
Imipramine HCl[5]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Isoniazid[16]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Itraconazole[22]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Ketoconazole[16]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Ketoprofen[3]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Labetalol HCl (tablets)[22]	40 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Lamotrigine[3]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Lansoprazole[18]	2 mg / mL	○	8	○	○	○
Levodopa and carbidopa[5]	5 / 1.25 mg / mL	60 / 30	2 8	✓	○	2
	10 / 2.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Levofloxacin[20]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Levothyroxine Sodium (T4)	25 µg / mL	90	2	✓	○	2
Lisinopril (as dihydrate)[16]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Lomustine	4 mg / mL	90	2	✓	○	2
	10 mg / mL	90	2	✓	○	2
Loperamide HCl[17]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Lorazepam[5]	1 mg / mL	90 / 60	2 8	✓	○	2
Mebeverine HCl[21]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Melatonin[22]	3 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Mercaptopurine (tablets)[28]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Methadone HCl[28]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Methotrexate[17]	2.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Methyldopa	50 mg / mL	90	2	✓	○	2
Metoprolol tartrate[20]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Metronidazole benzoate[7]	80 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Midazolam (as HCl, injection fluid)[8, 19]	1 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Minocycline HCl[5]	10 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Nadolol[17]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Naltrexone HCl[17]	1 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Naproxen[16]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Nifedipine[1]	4 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Nitrendipine (tablets)*. [24]	5 mg / mL	60	8	○	○	○
Nitrofurantoin**. [20, 29]	2 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Omeprazole[9, 18]	2 mg / mL	○	8	○	60	2
	5 mg / mL	○	8	○	60	2
Ondansetron HCl	0.8 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Oseltamivir (as phosphate, capsules)[10, 19, 28]	6 mg / mL	90	2	✓	○	2
	15 mg / mL	90	2	✓	○	2
Oxandrolone[20]	3 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Oxybutynin*	5 mg / mL	8	8	○	○	○
Pantoprazole sodium[18]	3 mg / mL	○	8	○	60	2
Paracetamol (acetaminophen)[16]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Penicillamine[3]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Pentoxiphylline[17]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Phenobarbital[1, 28]	9 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	15 mg / mL	90	2	✓	○	2
Phenytoin[2]	15 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Prednisone*. [25]	5 mg / mL	60	8	○	○	○
Prednisolone sodium phosphate[1]	1.5 mg / mL	30	2 8	✓	○	2
Pregabalin[20]	20 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Procarbazine	10 mg / mL	30	2	✓	○	2
Propranolol HCl[11, 19, 28]	0.5 mg / mL	90	2	✓	○	2
	1 mg / mL	90	8	○	○	○
	5 mg / mL	90	2	✓	○	2
Propylthiouracil[21]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Pyrazinamide*. [26, 28]	100 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Pyridoxine HCl (vit. B6)[2]	50 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Quinidine sulfate[21]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Rabeprazole[18]	3 mg / mL	○	8	○	○	○
Ranitidine HCl[1]	14 mg / mL	58 / 36	2 8	✓	○	2
Riboflavin (vit. B2)[20]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Rifampicin (rifampicin)[12]	25 mg / mL	60	2 8	✓	○	2
Sertraline HCl[16]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Sildenafil citrate	2.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Simvastatin[1]	1 mg / mL	90	2	✓	○	2
Sotalol HCl (tablets)[28]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Spironolactone[1, 28]	2.0 mg / mL	90	2	✓	○	2
	2.5 mg / mL	90	2	✓	○	2
	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Spironolactone and hydrochlorothiazide[22]	5 / 5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Sulfadiazine[2]	100 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Sulfasalazine[2]	100 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Tacrolimus (as monohydrate)[5, 28]	0.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	1 mg / mL	90	2	✓	○	2
Terbinafine HCl[5]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Tetracycline HCl[2]	25 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Thiamine HCl (vit. B1)[3]	100 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Thioguanine[29]	2.5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Tiagabine HCl (tablets)[22]	1 mg / mL	90 / 30	2 8	✓	○	2
Topiramate[21]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Tramadol HCl[5, 31]	5 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
	30 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Trimethoprim[2]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Valsartan[5]	4 mg / mL	90	2 8	✓	○	2
Vancomycin HCl[14, 28]	25 mg / mL	90	2	✓	○	2
	50 mg / mL	90	2	✓	○	2
Verapamil HCl[15]	50 mg / mL	60	2	✓	○	2
Warfarin sodium (tablets)*. [27]	1 mg / mL	44 / 10	2 8	✓	○	2
Zonisamide[2]	10 mg / mL	90	2 8	✓	○	2

✓ Συμβατός συνδυασμός ○ Συνδυασμός που δε συνίσταται 2 2-8 °C 8 15-25 °C Συνθήκες αποθήκευσης

Μέθοδος παρασκευής SyrSpend® SF



SYRSPEND® SF PH4 ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ ΥΓΡΟ

1. Υπολογίστε, ζυγίστε και μετρήστε τις δραστικές ουσίες (APIs). Εάν κριθεί απαραίτητο, μειώστε το μέγεθος των σωματιδίων της δραστικής ουσίας ή των θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου των καψακίων. Κατόπιν, εάν απαιτείται διαβροχή, προσθέτετε κατάλληλη ποσότητα μέσου εναιωρήματος SyrSpend® SF PH4 ως παράγοντας διαβροχής.
2. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της γεωμετρικής αραίωσης, προσθέστε το SyrSpend® SF PH4 παχύρευστο υγρό στην προετοιμασμένη σκόνη για να φτάσει το εναιώρημα στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα στον τελικό περιέκτη.



SYRSPEND® SF PH4 ΝΕΟ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ

1. Υπολογίστε, ζυγίστε και μετρήστε τις δραστικές ουσίες (APIs). Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος των σωματιδίων της δραστικής ουσίας ή των θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου των καψακίων.
2. Προσθέτετε τη δραστική ουσία (API) στον ειδικό διαβαθμισμένο περιέκτη του SyrSpend® SF PH4 NEO ξηρή σκόνη και ομογενοποιήστε τις σκόνες κατευθείαν στον περιέκτη.
3. Προσθέτετε νερό στον περιέκτη για να φτάσετε στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα.



SYRSPEND® SF PH4 ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ

1. Υπολογίστε, ζυγίστε και μετρήστε τις δραστικές ουσίες (APIs). Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος των σωματιδίων της δραστικής ουσίας ή των θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου των καψακίων.
2. Προσθέτετε τη δραστική ουσία (API) στον ειδικό διαβαθμισμένο περιέκτη του SyrSpend® SF PH4 ξηρή σκόνη και ομογενοποιήστε τις σκόνες κατευθείαν στον περιέκτη.
3. Προσθέτετε νερό στον περιέκτη για να φτάσετε στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα.



SYRSPEND® SF CONVENIENCE PACKS (ΚΙΤ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

1. Απομακρύνετε από τα τοιχώματα το περιεχόμενο των περιεκτών που περιέχουν σκόνη με ήπια χτυπήματα.
2. Προσθέστε την δραστική ουσία στον ειδικό διαβαθμισμένο περιέκτη του SyrSpend® SF ξηρή σκόνη και ομογενοποιήστε τις σκόνες. Ξεπλύνετε το φιαλίδιο μονοδόσης δραστικής ουσίας με νερό για να εξασφαλίσετε ότι δε θα παραμείνουν υπολείμματα της σκόνης στη συσκευασία.
3. Προσθέστε επιπλέον νερό στο διαβαθμισμένο περιέκτη για να φτάσετε στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα.



Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

Fagron personalizing medicine

SSSFCT011

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πρoτεινόμενων συνταγών σε γενικά θέματα όπως η χρήση, την αφομοίωση, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα, οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς και δε θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως αποκλειστικό εναγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δε μπορεί να εξαντλεί ως τεχνική αυτοδιοίκησης και ανιχνεύει ή ενδύνη ως προς το τελικό γιλληνικό εμφανίζεται παρακάτω.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Geiger CM, Sorenson B, Whaley P. Stability Assessment of 10 Active Pharmaceutical Ingredients Compounded in Syrspend SF. Int J Pharm Compd. 2015;19:420-7.
2. Ferreira AO, Polonini HC, Silva SL, Patrício FB, Brandão MA. Rapsos NR. Feasibility of amlodipine besylate, chloroquine phosphate, dapsone, phenytoin, pyridoxine hydrochloride, sulfadiazine, sulfasalazine, tetracycline hydrochloride, trimethoprim and zonisamide in SyrSpend® SF PH4 oral suspensions. J Pharm Biomed Anal. 2016;118:105-112.
3. Polonini HC, Loures S, Lima LC, Ferreira AO, Brandão MAF. Stability of Atenolol, Clonazepam, Dexmethasone, Diclofenac Sodium, Diltiazem, Enalapril Maleate, Ketoprofen, Lamotrigine, Penicillamine-D and Thiamine in Syrspend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2016;20:167-174.
4. Geiger CM, Sorenson B, Whaley PA. Stability of Captopril in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2013;17:336-338.
5. Polonini HC, Silva SL, Cunha CN, Brandão MAF, Ferreira AO. Compatibility of cholecalciferol, haloperidol, imipramine hydrochloride, levodopa/carbidopa, lorazepam, minocycline hydrochloride, tacrolimus monohydrate, terbinafine, tramadol hydrochloride, valsartan in SyrSpend® SF PH4 oral suspensions. Pharmazie. 2016;71:185-91.
6. Sorenson B, Voudre MA, Gehrig D. Stability of Gabapentin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:347-349.
7. Vu NT, Alomanis V, Ben MJ, Kupiec TC, Patterson EK, Radke J, Erickson MA, Schneider G. Stability of Metronidazole Benzoate in SyrSpend SF One-step Suspension System. Int J Pharm Compd. 2008;12:558-564.
8. Geiger CM, Sorenson B, Whaley PA. Stability of Midazolam in SyrSpend SF and SyrSpend SF Cherry. Int J Pharm Compd. 2013;17:344-346.
9. Whaley PA, Voudre MA, Sorenson B. Stability of Omeprazole in SyrSpend SF Alka (Reconstituted). Int J Pharm Compd. 2012;16:164-166.
10. Voudre MA, Allen B. Stability of Oseltamivir Phosphate in SyrSpend SF, Cherry Syrup and SyrSpend SF (for Reconstitution). Int J Pharm Compd. 2010;14:82-85.
11. Geiger CM, Voudre MA, Sorensen B. Stability of Propranolol Hydrochloride in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:513-515.
12. Sorenson B, Whaley P. Stability of Rifampin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2013;17:162-164.
13. Geiger CM, Voudre MA, Sorenson B. Stability of Ursodiol in SyrSpend SF Cherry Flavored. Int J Pharm Compd. 2012;16:510-512.
14. Whaley PA, Voudre MA. Stability of Vancomycin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:167-169.
15. Voudre MA, Alexander B, Allen B. Stability of Verapamil Hydrochloride in SyrSpend SF compared to Sorbitol containing syrup and suspending vehicles. Int J Pharm Compd. 2011;15:255-258.
16. Polonini HC, Loures S, de Araujo ED, Brandao MAF and Ferreira AO. Stability of Allopurinol, Amitriptyline Hydrochloride, Carbamazepine, Domperidone, Isoniazid, Ketoconazole, Lisinopril, Naproxen, Paracetamol (Acetaminophen) and Sertraline Hydrochloride in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2016;20:426-434.
17. Polonini HC, Silva SL, de Almeida TR, Brandão MAF and Ferreira AO. Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. Eur J Hosp Pharm. 2016
18. Polonini HC, Silva SL, Loures S, Almy R, Balland A, Brandão MAF and Ferreira AO. Compatibility of proton pump inhibitors in a preservative-free suspending vehicle. Eur J Hosp Pharm 2016;0:1-7.
19. Dijkers ECF, Nankhkan V, Thoissen A. Updated Stability Data of Midazolam, Oseltamivir Phosphate, and Propranolol Hydrochloride in SyrSpend SF Wellness Oral Suspension. Int J Pharm Compd. 2017;21:240-241.
20. Ferreira AO, Polonini HC, Loures S, Silva S, Cerqueira de Melo VA, de Andrade L and Brandao MAF. Stability of Alprazolam, Atropine Sulfate, Glutamine, Levofloxacin, Metoprolol Tartrate, Nitrofurantoin, Ondansetron Hydrochloride, Oxandrolone, Pregabalina, and Riboflavin in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2017;21:255-263.
21. Polonini HC, Loures da Silva S, Buzinari Agio NC, Abreu J, Brandão MAF and Ferreira AO. Stability of Acetazolamide, Baclofen, Diprridamole, Mebeverine Hydrochloride, Propylthiouracil, Quinidine Sulfate, and Topiramate Oral Suspensions in SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compd. 2017;21:339-346.
22. Uriel M, Gómez-Rincón C, Marro, D. Stability of regularly prescribed oral liquids formulated with SyrSpend® SF. Die Pharmazie. 2018; 73:196-201.
23. Barbazan C, Le Baré B, Lester MA and Boivin PN. Etude de stabilité d'une suspension buvable de cloxacilline à usage pédiatrique. Poster presentation at 11th Rencontres Convergences Santé Hôpital 2016.
24. Bellay K, Lesourd F, Quillec C, Giquel T, Boivin PN and Lester MA. Stabilité d'une suspension buvable de nitrendipine à 5 mg/mL. Poster presentation at 11th Rencontres Convergences Santé Hôpital 2016.
25. Bonnaure AC, Bellay K, Rault P, Lester MA and Boivin PN. Stability study of 5 mg/ml prednisone oral suspension in SyrSpend® 20th European GERPAC Conference 2017.
26. Boivin P, Geffroy C, Tron C, et al PP-054 Stability study of 100 mg/ml paediatric prazinamide oral suspension in syrspend. Eur J Hosp Pharm 2017;24:A225.
27. Guillois G, Fetigue L, Perovic I, et al PP-028 Stability study of 1 mg/ml paediatric warfarin oral suspension in syrspend. Eur J Hosp Pharm 2017;24:A214.
28. Polonini H, da Silva SL, Brandão MAF, Bauters T, De Meerbeeck B, Ferreira AO. Compatibility of Baclofen, Carvedilol, Hydrochlorothiazide, Mercaptopurine, Methadone Hydrochloride, Oxetamivir Phosphate, Phenobarbital, Propranolol Hydrochloride, Pyrazinamide, Sodiol Hydrochloride, Spironolactone, Tacrolimus Monohydrate, Ursodeoxycholic Acid, and Vancomycin Hydrochloride Oral Suspensions Compounded with Syrspend SF PH4. Int J Pharm Compd. 2018 Nov-Dec;22(6):516-526.
29. Polonini H, da Silva SL, de Araújo EF, Ferreira AO, Aangenstou K, Dijkers ECF. Stability of Azathioprine, Clonidine Hydrochloride, Cloridogrel bisulfate, Ethambutol Hydrochloride, Griseofulvin, Hydralazine Hydrochloride, Nitrofurantoin and Thioguanine oral suspensions compounded with SyrSpend® SF PH4. Int J Pharm Compd. 2020 May-June;24(3):252-262.
30. Zenon D, Manca A, De Nicolò A, et al. Data on the stability of darunavir/cobicistat suspension after tablet manipulation [Published online ahead of print, 2020 Apr 12]. Data Brief. 2020;30:105552.
31. Espana B, Joseph-Tornabène F, Jaquet Cécile, Perrot S, Prouillac C. Stability of Extemporaneous Oral Tramadol, Fluoxetine, and Doxycycline Suspensions in SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compd. 2020 Jul-Aug;24(4):327-336.
(Published Online First).

Μπορείτε να ανατρέξετε στο Compounding Matters στο fagron.gr για φόντιες παρασκευής και σθηγιες χρήσης αδειών.

Τα μέσα εναιωρήματος SyrSpend® SF επιτρέπουν την παρασκευή σταθερών εναιωρημάτων για ένα ευρύ φάσμα φαρμακευτικών ουσιών (APIs). Ο συγκεκριμένος πίνακας περιλαμβάνει μερικούς ασθενούς ενδιαφέρον για τους οποίους έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες σταθερότητας αποδεικνύοντας την ευρεία εφαρμογή τους για παρασκευή βάσιμων φαρμάκων. Η σταθερότητα ενός φαρμακευτικού συστατικού από τον πίνακα μπορεί να διαφέρει σε συνθήκες διαφορετικές από εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις μελέτες. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Fagron.

Τα γνωσιμότητα σε χρόνο (Σημ. οκόνη) και SyrSpend® SF PH4 (Σημ. οκόνη) δεν περιέχουν συντηρητικά και πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2-8°C. Όταν οι αιθάτες συνθήκες γνώσης δεν προτείνονται κατά τη χρόνο ενός εναιωρήματος με τη χρόνο (Σημ. οκόνη), η προτεινόμενη ημερομηνία λήξης-χρόνος μετά την παρασκευή του είναι 30 ημέρες. (Εξαίρεση αποτελούν τα εναιωρήματα με Azathioprine, Captopril, Cloxacillin, Darunavir & cobicistat και Oxybutynin για τα οποία η προτεινόμενη ημερομηνία λήξης-χρόνος είναι αντίστοιχα 14, 5, 7 και 8 ημέρες.)

* Μελέτη που πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητες επιτηρμονικές ομάδες χωρίς επίβλεψη από τη Fagron. Για λήψη λίστα με όλες τις αναφορές, ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο: www.fagron.com/en/external-study-overview.

** Στις υψηλότερες συγκεντρώσεις μπορεί το ιξώδες της μεταφοράς του χρόνου. Εάν απαιτούνται οι υψηλότερες συγκεντρώσεις, βεβαιωθείτε ότι το ιξώδες είναι αποδεκτό κατά το χειρισμό του εναιωρήματος. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Compounding Matters στο fagron.gr για οδηγίες παρασκευής σε συνδυασμό με νερό για εναιωρήματα με nitrofurantoin.

*** Να μην προστίθενται τεχνητά βελτιωτικά και ζάχαρη. Peske L. Compounding: Hydroxychloroquine. Am. Druggist. 1993;207:57