Fagron Advanced Derma

Πίνακας συμβατότητας

ΛΕΖΑΝΤΑ

Συμβατός συνδυασμός για

- 15 ημέρες
- 30 ημέρες
- 60 ημέρες
- 90 ημέρες
- 120 ημέρες
- 150 ημέρες
- 180 ημέρες

- Συνιστώμενος συνδυασμός
- % Μέγιστη συμβατότητα
- ✕ Συνδυασμός που δε συνίσταται
- ○ Συνδυασμός χωρίς μελέτη συμβατότητας

ΤΥΠΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Λιπαρό δέρμα | Κανονικό δέρμα | Ξηρό δέρμα | Πολύ ξηρό δέρμα | Προσβεβλημένο δέρμα | Ειδική περιοχή εφαρμογής

API/DCI	ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ	OCCLUVAN™	EMOLIVAN™	VERSATILE™ RICH	VERSATILE™	VERSATILE™ ANHYDROUS	NOURIVAN™ ANTIOX	FITALITE™	CLEODERM™	SERAQUA™	ESPUMIL™
Adapalene	0.1% έως 0.3%	○	○	○	○	○	○	○	○ / ○	○	○
Alpha arbutin	0.5% έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Alfatradiol (17α-estradiol)	0.025 έως 0.05%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aloe vera extract	0.5 έως 10%	○	○	○	○	○	8% ○	5% ○	○	○	○
Alpha bisabolol	0.5 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○*	1% ○	○
	0.5 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	1% ○	○
Ammonium lactate	1 έως 12%	○	○	10% ○	10% ○	○	8% ○	✕	○	○	○
Anthraline/dithranol	0.05 έως 3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Arginine HCl	2.5%	○	○	○	○	○	○	✕	○	✕	○
Ascorbic acid (vit. C)	5 έως 15%	○	○	○	○	○	○	✕	○	10% ○	○
	5 έως 20%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Azelaic acid	10 έως 20%	○	✕	○	○	○	○	○	○	✕	○
	10 έως 25%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Benzoyl peroxide	2.5 έως 10%	○	○	○	○	○	✕	5% ○	○	○	○
Benzyl benzoate	25%	○	○	✕	○	○	○	✕	○	○	○
Betamethasone dipropionate	0.05%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Betamethasone valerate	0.025 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Brimonidine tartrate	0.2 έως 0.5%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Caffeine	1 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chamomile extract	0.5 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ciclopirox olamine	1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clindamycin HCl	1 έως 3%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Clobetasol propionate	0.05%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Clotrimazole	1 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coal tar crude (pix lithanthracis)	1 έως 10%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Coal tar solution (LCD)	5 έως 20%	10% ○	○	10% ○	10% ○	○	○	○	○	○	○
Cyanocobalamin (vit. B12)	0.07%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cyproterone acetate	0.5% έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dapsone	5 έως 10%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Desonide	0.05 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Desoximetasone	0.25%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Dexpanthenol	0.5 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diclofenac sodium	3%	○	○	○	○	○	○	✕	○	○	○
Diflucortolone valerate	0.1 έως 0.3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ellagic acid	0.25 έως 1%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Enoxolone	0.5 έως 2.5%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Erythromycin	0.5 έως 4%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	1 έως 4%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Estriol	0.1 έως 1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Finasteride	0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fluocinolone acetonide	0.01 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Glycerol	0.5 έως 20%	○	○	○	○	○	8% ○	5% ○	○	○	○
Glycolic acid	2 έως 10%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
	5 έως 15%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hyaluronic acid	0.2 έως 2.5%	○	✕	✕	✕	○	○	✕	○	✕	○
Hydrocortisone	0.25 έως 2.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydrocortisone acetate	0.25 έως 2.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Hydroquinone	2 έως 10%	○	○	✕	✕	○	★	✕	○*	✕	○
Ivermectin	1 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Ketoconazole	2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kojic acid	1 έως 4%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Lactic acid	1 έως 20%	○	10% ○	○	○	○	○	○	○	○	○
Latanoprost	0.005%	○	○	○	○	○	○	○	○	120 ημέρες	○
Lidocaine	0.5 έως 10%	5% ○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Lidocaine HCl	0.5 έως 5%	✕	5% ○	○	○	○	○	✕	○	○	○
Mandelic acid	2 έως 10%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Melatonin	0.0033 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Menthol	1 έως 3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Metronidazole	0.5 έως 3%	○	○	○	○	○	✕	○	○	○	○
	0.75 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Minoxidil	2 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	180 ημέρες
Mometasone furoate	0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Nicotinamide (vit. B3)	1 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	2 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Permethrin	5 έως 15%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Progesterone	0.5 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Prostaquinon™	3%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3% ○
Resorcinol	15%	○	○	✕	✕	○	★	✕	○	○	○
Retinol (vit. A)	0.4%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Salicylic acid	0.5 έως 20%	○	○	10% ○	10% ○	○	○	5% ○	○	○	○
Shea butter	1 έως 20%	○	○	✕	○	○	8% ○	5% ○	○	✕	○
Sodium hyaluronate	1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Spironolactone	0.5 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sulfur	5 έως 10%	○	○	○	○	○	8% ○	5% ○	○	○	○
Tacrolimus	0.03 έως 0.5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tetracycline HCl	2 έως 3%	○	○	○	○	○	○	✕	○	○	○
Tocopherol (vit. E)	0.5 έως 20%	○	○	○	○	○	8% ○	5% ○	○	○	○
Tranexamic acid	1 έως 5%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tretinoin (vit. A acid)	0.01 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Triamcinolone acetonide	0.025 έως 0.1%	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Urea	5 έως 40%	✕	10% ○	○	○	○	○	○	○	○	○
Zinc oxide	1 έως 40%	○	○	25% ○	10% ○	○	8% ○	5% ○	○	○	○
Zinc pyrithione	1 έως 2%	○	○	○	○	○	○	○	○*	○	○
Zinc sulfate	1 έως 10%	○	○	○	○	○	8% ○	5% ○	○	✕	○

* Εκτιμώμενη ημερομηνία σταθερότητας (μελέτη συμβατότητας σε εξέλιξη). Ελλείψει ολοκλήρωσης σταθερότητας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατευθυντήρια γραμμή το σχετικό κεφάλαιο USP <795>, σύμφωνα με το οποίο προτείνεται ημερομηνία σταθερότητας όχι περισσότερη από 30 ημέρες.

Fagron Advanced Derma

Leading advanced dermatological care

Fagron personalizing medicine





Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
Τ.Κ. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

Fagron
personalizing medicine

FADCT10

Μπορείτε να επισκεφθείτε τη βάση δεδομένων Compounding Matters στο fagron.gr για να έχετε πρόσβαση σε βάση δεδομένων συνταγών και επιπλέον πληροφορίες για οδηγίες παρασκευής και συνθήκες αποθήκευσης.

Ο πίνακας συμβατότητας είναι ένα εργαλείο που σχεδιάστηκε από ιατρούς και φαρμακοποιούς για να σας διευκολύνει να αναζητήσετε τους βέλτιστους συνδυασμούς μεταξύ των γαληνικών βάσεων Fagron Advanced Derma και των διάφορων φαρμακευτικών ουσιών, όπως είναι οι δραστικές ουσίες (APIs) και τα δερματολογικά συστατικά που βελτιώνουν την κατάσταση του δέρματος (DCIs). Ο πίνακας περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό των κύριων APIs και DCIs που χρησιμοποιούνται στην δερματολογία. Ο πίνακας συμβατότητας άλλα και η δωρεάν βάση δεδομένων συνταγών Compounding Matters υποστηρίζουν τους επαγγελματίες υγείας να ανακαλύψουν θεραπευτικές επιλογές. APIs και DCIs που δεν συμπεριλαμβάνονται και στις δύο πηγές πληροφορίας μπορούν επίσης να σχηματίσουν ένα σταθερό γαληνικό παρασκεύασμα ώστε να βελτιώσει την άνεση και συμβατότητα του ασθενή με τη φαρμακοθεραπεία. Περαιτέρω συνδυασμός δραστικών σε μια βάση είναι εφικτή με σκοπό την εξατομίκευση της φαρμακοθεραπείας, ενώ η εταιρεία έλεγχει διαρκώς τους επιθυμητούς συνδυασμούς από τους επιστήμονες υγείας με σκοπό τη σταθερότητα του τελικού σκευάσματος. Όταν δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία μελέτης συμβατότητας για ένα συγκεκριμένο API/DCI, προτείνεται ο φαρμακοποιός να υπολογίσει την ημερομηνία λήξης του γαληνικού παρασκευάσματος με βάση εσωτερικά πρωτόκολλα, την ανάλυση ρίσκου ή τις οδηγίες όπως επιτάσσει οποιαδήποτε αναγνωρισμένη φαρμακοποιία.

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλο που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των προτεινόμενων συνταγών δε γίνονται αναφορές σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες δε συνιστούν εκπαίδευση ασθενούς και δε θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο επαγγελματικής διάγνωσης και θεραπείας. Το περιεχόμενο του παρόντος φυλλαδίου δε μπορεί να ερμηνευθεί ως ιατρική συμβουλή, σύσταση ή γνώμη. Οι επαγγελματίες υγείας - ιατροί και φαρμακοποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες και συνιστάται να πράξουν μόνο εφόσον κρίνεται σκόπιμο και σύμφωνα με την δική τους επαγγελματική γνώμη και κρίση. Η αποτελεσματικότητα κάθε συνταγής είναι άμεσα συνυφασμένη με τον τρόπο παρασκευής του γαληνικού φαρμάκου, την επιλογή του κατάλληλου εργαστηρίου παρασκευής ενώ το γαληνικό παρασκεύασμα δε συνιστά ένα τελικό προϊόν που χρήζει αδειοδότησης και αναφορές στις αρχές. Για τους αναπτέρω λόγους η Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, σε κάθε περίπτωση για τις συνταγές ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και για οποιαδήποτε παραβίαση δπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή ευθύνη ως προς το τελικό γαληνικό παρασκεύασμα.

Fagron Advanced Derma

Πίνακας συμβατότητας