SyrSpend® SF

Πίνακας συμβατότητας

Λεζάντα

- Συμβατός συνδυασμός για 30 ημέρες
- Συμβατός συνδυασμός για 60 ημέρες
- Συμβατός συνδυασμός για 90 ημέρες
- Συνδυασμός που δε συνίσταται
- Συμβατός συνδυασμός

Συνθήκες αποθήκευσης
- 15-25°C
- 2-8°C

API	Βασικές συγκεντρώσεις	SYRSPEND® SF PH4 (ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ)		SYRSPEND® SF PH4 (ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ)		SYRSPEND® SF ALKA (ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ)	
							
Acetaminophen (paracetamol)[16]	50 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Acetazolamide[21]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Allopurinol[16]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Alprazolam[20]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Amiodarone HCl[1]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Amitriptyline HCl[16]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Amlodipine (as besilate)[2]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Atenolol[3]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	❄	❄	⊗	⊗
	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	❄	❄	⊗	⊗
Atropine sulfate[20]	0.1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Baclofen[21]	2 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Caffeine[17]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Captopril[4]	0.8 mg/mL	**14 ημ.**	❄	✓	❄	⊗	⊗
Carbamazepine[16]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Carvedilol[16]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
	5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Celecoxib (capsules)[22]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Chloral hydrate[22]	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Chloroquine phosphate[2]	15 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Cholecalciferol (vit. D3)[5]	50,000 IU/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Ciprofloxacin	50 mg/mL	● / ●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Clomipramine HCl[17]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Clonazepam[3]	0.2 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Clonidine HCl	0.1 mg/mL	**7 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Clopidogrel (as bisulfate, tablets)	5 mg/mL	🟡	❄	✓	❄	⊗	⊗
Cloxacillin (capsules)*[,23]	50 mg/mL	**5 ημ.**	❄	✓	❄	⊗	⊗
Cyanocobalamine (vit. B12)	0.2 mg/mL	●	🟧	⊗	⊗	⊗	⊗
Cyclosporine[22]	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Dapsone[2]	2 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Dexamethasone[3]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Diclofenac sodium[3]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Diltiazem HCl[3]	12 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Dipyridamole[21]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Domperidone[16]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Enalapril maleate[3]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Esomeprazole magnesium**[,18]	3 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	●	❄
Ethambutol 2 HCl**	50 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Flecainide acetate (tablets)[22]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Folic acid[17]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Furosemide[1]	10 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	**14 ημ.**	❄
Gabapentin[6]	50 mg/mL	● / **125 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Glutamine[20]	250 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Glycopyrrolate (glycopyrronium bromide)[22]	0.5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Griseofulvin	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Haloperidol[5]	0.5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Hydrochlorothiazide[17]	2 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Hydrocortisone[22]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Hydrocortisone hemisuccinate[1]	2 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Hydrocortisone sodium phosphate[1]	2 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Imipramine HCl[5]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Isoniazid[16]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Itraconazole[22]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Ketoconazole[16]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Ketoprofen[3]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Labetalol HCl (tablets)	40 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Lamotrigine[3]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Lansoprazole[18]	2-5 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Levodopa/Carbidopa[5]	5/1.25 mg/mL	● / 🟡	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Levofloxacin[20]	50 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Lisinopril (as dihydrate)[16]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Loperamide HCl[17]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Lorazepam[5]	1 mg/mL	● / ●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Mebeverine HCl[21]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Melatonin[22]	3 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Mercaptopurine	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Methadone HCl	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Methotrexate[17]	2.5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Metoprolol tartrate[20]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Metronidazole benzoate[7]	80 mg/mL	**716 ημ. / 366 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Midazolam (as HCl, injection fluid)[8,19]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Minocycline HCl[5]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Nadolol[17]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Naltrexone HCl[17]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Naproxen[16]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Nifedipine[1]	4 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Nitrendipine (tablets)*[,24]	5 mg/mL	●	🟧	⊗	⊗	⊗	⊗
Nitrofurantoin[20]	2 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Omeprazole**[,9,18]	2 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	●	❄
	5 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	●	❄
Ondansetron HCl	0.8 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Oseltamivir (as phosphate, capsules)[10,19]	6 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	15 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Oxandrolone[20]	3 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Pantoprazole sodium**[,18]	3 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	●	❄
Penicillamine[3]	50 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Pentoxifylline[17]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Phenobarbital[1]	9 mg/mL	● / **154 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
	15 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Phenytoin[2]	15 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Prednisolone*[,25]	5 mg/mL	●	🟧	⊗	⊗	⊗	⊗
Prednisolone sodium phosphate[1]	1.5 mg/mL	🟡	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Pregabalin[20]	20 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Propranolol HCl[11,19]	0.5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	1 mg/mL	**146 ημ.**	🟧	⊗	⊗	⊗	⊗
	5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Propylthiouracil[21]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Pyrazinamide*[,26]	100 mg/mL	●	🟧	⊗	⊗	⊗	⊗
Pyridoxine HCl (Vit. B6)[2]	50 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Quinidine sulfate[21]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Rabeprazole[18]	3 mg/mL	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Ranitidine HCl[1]	14 mg/mL	**58 ημ. / 36 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Riboflavin (vit. B2)[20]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Rifampin (rifampicin)[12]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Sertraline HCl[16]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Sildenafil citrate	2.5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Simvastatin[1]	1 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Sotalol HCl (tablets)	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Spironolactone[1]	2.0 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	2.5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Spironolactone/Hydrochlorothiazide[22]	5/5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Sulfadiazine[2]	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Sulfasalazine[2]	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Tacrolimus (as monohydrate)[5]	1 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
	0.5 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Terbinafine HCl[5]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Tetracycline HCl[2]	25 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Thiamine HCl (vit. B1)[3]	100 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Tiagabine HCl (tablets)	1 mg/mL	● / 🟡	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Topiramate[21]	5 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Tramadol HCl[5]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Trimethoprim[2]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Ursodiol (ursodeoxycholic acid)[13]	20 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	30 mg/mL	**66 ημ.**	❄	✓	❄	⊗	⊗
Valsartan[5]	4 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Vancomycin HCl[14]	25 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
	50 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Verapamil HCl[15]	50 mg/mL	●	❄	✓	❄	⊗	⊗
Warfarin sodium (tablets)*[,27]	1 mg/mL	**44 ημ. / 10 ημ.**	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗
Zonisamide[2]	10 mg/mL	●	❄ / 🟧	✓	❄	⊗	⊗

* Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από επιστημονικές ομάδες ανεξαρτήτων εργαστηρίων. Για την πλήρη λίστα των επιστημονικών αναφορών, παρακαλείστε να ανατρέξετε στη διεύθυνση: www.fagron.com/el/external-study-overview.
** Να γίνει χρήση δραστικής φαρμακευτικής ουσίας (API) κατά την παρασκευή του πόσιμου εναιωρήματος.

Η απουσία ενός δραστικού συστατικού από τον πίνακα συμβατότητας δε συνιστά την παρασκευή εναιωρήματος με χρήση του μέσου εναιώρησης SyrSpend® SF ανέφικτη. Τα εναιωρήματα με τη χρήση των SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη) και SyrSpend® SF PH4 Alka (ξηρή σκόνη) δεν περιέχουν συντηρητικά και πρέπει να αποθηκεύονται σε θερμοκρασία 2-8°C. Όταν οι απόλυτες συνθήκες υγιεινής δεν μπορούν να εξασφαλιστούν κατά τη λήψη ενός εναιωρήματος με τη χρήση του SyrSpend® SF PH4 (ξηρή σκόνη), η προτεινόμενη ημερομηνία λήξης χρήσης μετά την παρασκευή συνιστάται να ορίζεται από τον παρασκευαστή φαρμακοποιό ως μία σύντομη ημερομηνία βασιζόμενη σε επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας, ανάλυση ρίσκου και τις κατευθυντήριες αναφορές από επικαιροποιημένες φαρμακοποιίες. Για επιπλέον πληροφορίες αναφορικά με τη μέγιστη ημερομηνία χρήσης μπορείτε να επικοινωνήσετε και με το επιστημονικό τμήμα της εταιρείας. Μπορείτε να ανατρέξετε στο Compounding Matters στο fagron.gr για οδηγίες παρασκευής και οδηγίες χρήσης ασθενών.

Fagron
personalizing medicine

Μέθοδος παρασκευής SyrSpend® SF



SYRSPEND® SF PH4 ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ

1. Υπολογίστε, ζυγίστε και μετρήστε τις δραστικές ουσίες (APIs). Εάν κριθεί απαραίτητο, μειώστε το μέγεθος των σωματιδίων της δραστικής ουσίας ή των θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου των καψακίων. Κατόπιν, εάν απαιτείται διαβροχή, προσθέτετε κατάλληλη ποσότητα μέσου εναιωρήματος SyrSpend® SF PH4 ως παράγοντας διαβροχής.
2. Χρησιμοποιώντας την τεχνική της γεωμετρικής αραίωσης, προσθέστε το SyrSpend® SF PH4 εναιώρημα στην προετοιμασμένη σκόνη για να φτάσει το εναιώρημα στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα στον τελικό περιέκτη.



SYRSPEND® SF PH4 ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ

1. Υπολογίστε, ζυγίστε και μετρήστε τις δραστικές ουσίες (APIs). Εάν είναι απαραίτητο, θα πρέπει να μειώσετε το μέγεθος των σωματιδίων της δραστικής ουσίας ή των θρυμματισμένων δισκίων ή του περιεχομένου των καψακίων.
2. Προσθέτετε τη δραστική ουσία (API) στον ειδικό διαβαθμισμένο περιέκτη του SyrSpend® SF PH4 ξηρή σκόνη και ομογενοποιήστε τις σκόνες κατευθείαν στον περιέκτη.
3. Προσθέτετε νερό στον περιέκτη για να φτάσετε στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα.



SYRSPEND® SF CONVENIENCE PACKS (ΚΙΤ ΓΑΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ)

1. Χαλαρώστε το περιεχόμενο του περιέκτη δραστικής ουσίας με ήπια χτυπήματα.
2. Προσθέστε την δραστική ουσία στον ειδικό εγκεκριμένο περιέκτη του SyrSpend® SF ξηρή σκόνη και ομογενοποιήστε τις σκόνες. Ξεπλύνετε το φιαλίδιο μονοδόσης δραστικής ουσίας με νερό για να εξασφαλίσετε ότι δε θα παραμείνουν υπολείμματα της σκόνης στη συσκευασία.
3. Προσθέστε επιπλέον νερό στο δοχείο διανομής για να φτάσετε στον τελικό όγκο και ανακινήστε έντονα.



Fagron Hellas
12 χλμ. Ε.Ο. Τρικάλων - Λάρισας
T.K. 42100, Τ.Θ. 32
Τρίκαλα, Ελλάδα

T +30 24310 83633-5
F +30 24310 83615
www.fagron.gr

Fagron
personalizing medicine

SSSFCT08

Δήλωση Ευθύνης: Παρόλα που έχουν γίνει εκτενείς προσπάθειες να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πρoτεινόμενων συνταγών σε γίνονται αναφορές σχετικά με τη χρήση, την ασφάλεια, αποτελεσματικότητα ή βιοδιαθεσιμότητα τους. Οι παρεχόμενες πληροφορίες σε συνέχεια εκπαίδευση ασθενούς και φαρμακοποιός στις αρχές. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, ο Fagron Hellas δεν αποδέχεται και δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση, σε καθε περίπτωση για τις συνέπειες ή τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν και για οποιαδήποτε παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ως προς το τελικό γαλενικό παρασκεύασμα.

Βιβλιογραφικές αναφορές

1. Geiger CM, Sorenson B, Whaley P. Stability Assessment of 10 Active Pharmaceutical Ingredients Compounded in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2015;19:420-7.
2. Ferreira AO, Polonini HC, Silva SL, Patrício FB, Brandão MA, Raposo NR. Feasibility of amlodipine besylate, chloroquine phosphate, dapsone, phenytoin, pyridoxine hydrochloride, sulfadiazine, sulfasalazine, tetracycline hydrochloride, trimethoprim and zonisamide in SyrSpend® SF PH4 oral suspensions. J Pharm Biomed Anal 2016;118:105-112.
3. Polonini HC, Loures S, Lima LC, Ferreira AO, Brandão MAF. Stability of Atenolol, Clonazepam, Dexamethasone, Diclofenac Sodium, Diltiazem, Enalapril Maleate, Ketoprofen, Lamotrigine, Penicillamine-D and Thiamine in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2016;20:167-174.
4. Geiger CM, Sorenson B, Whaley PA. Stability of Captopril in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2013;17:336-338.
5. Polonini HC, Silva SL, Cunha CN, Brandão MAF, Ferreira AO. Compatibility of cholecalciferol, haloperidol, imipramine hydrochloride, levodopa/carbidopa, lorazepam, minocycline hydrochloride, tacrolimus monohydrate, terbinafine, tramadol hydrochloride, valsartan in SyrSpend® SF PH4 oral suspensions. Pharmazie. 2016;71:185-91.
6. Sorenson B, Voudre MA, Gehrig D. Stability of Gabapentin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:347-349.
7. Vu NT, Aloumanis V, Ben MJ, Kuplet TC, Patterson EK, Radke J, Erickson MA, Schneider G. Stability of Metronidazole Benzoate in SyrSpend SF Onestep Suspension System. Int J Pharm Compd. 2008;12:558-564.
8. Geiger CM, Sorenson B, Whaley PA. Stability of Midazolam in SyrSpend SF and SyrSpend SF Cherry. Int J Pharm Compd. 2013;17:344-346.
9. Whaley PA, Voudre MA, Sorenson B. Stability of Omeprazole in SyrSpend SF Alka (Reconstituted). Int J Pharm Compd. 2012;16:164-166.
10. Voudre MA, Allen B. Stability of Oseltamivir Phosphate in SyrSpend SF, Cherry Syrup and SyrSpend SF (For Reconstitution). Int J Pharm Compd. 2010;14:82-85.
11. Geiger CM, Voudre MA, Sorensen B. Stability of Propranolol Hydrochloride in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:513-515.
12. Sorenson B, Whaley P. Stability of Rifampin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2013;17:162-164.
13. Geiger CM, Voudre MA, Sorenson B. Stability of Ursodiol in SyrSpend SF Cherry Flavored. Int J Pharm Compd. 2012;16:510-512.
14. Whaley PA, Voudre MA. Stability of Vancomycin in SyrSpend SF. Int J Pharm Compd. 2012;16:167-169.
15. Voudre MA, Alexander B, Allen B. Stability of Verapamil Hydrochloride in SyrSpend SF compared to Sorbitol containing syrup and suspending vehicles. Int J Pharm Compd. 2011;15:255-258.
16. Polonini HC, Loures S, de Araujo ED, Brandão MAF and Ferreira AO. Stability of Allopurinol, Amitriptyline Hydrochloride, Carbamazepine, Domperidone, Isoniazid, Ketoconazole, Lisinopril, Naproxen, Paracetamol (Acetaminophen), and Sertraline Hydrochloride in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2016;20:426-434.
17. Polonini HC, Silva SL, de Almeida TR, Brandão MAF and Ferreira AO. Compatibility of caffeine, carvedilol, clomipramine hydrochloride, folic acid, hydrochlorothiazide, loperamide hydrochloride, methotrexate, nadolol, naltrexone hydrochloride and pentoxifylline in SyrSpend SF PH4 oral suspensions. Eur J Hosp Pharm. 2016 (Published Online First).
18. Polonini HC, Silva SL, Loures S, Almy R, Balland A, Brandão MAF and Ferreira AO. Compatibility of proton pump inhibitors in a preservative-free suspending vehicle. Eur J Hosp Pharm 2016;0:1-7.
19. Dykers ECF, Nanhekhan V, Thorissen A. Updated Stability Data of Midazolam, Oseltamivir Phosphate, and Propranolol Hydrochloride in SyrSpend SF and Mirtazapine in Esomil. Int J Pharm Compd. 2017;21:240-241.
20. Ferreira AO, Polonini HC, Loures da Silva S, Cerqueira de Melo VA, de Andrade L and Brandão MAF. Stability of Alprazolam, Atropine Sulfate, Glutamine, Levofloxacin, Metoprolol Tartrate, Nitrofurantoin, Ondansetron Hydrochloride, Oxandrolone, Pregabaline, and Riboflavin in SyrSpend SF PH4 Oral Suspensions. Int J Pharm Compd. 2017;21:255-263.
21. Polonini HC, Loures da Silva S, Buzinari Aglio NC, Abreu J, Brandão MAF and Ferreira AO. Stability of Acetazolamide, Baclofen, Dipyridamole, Mebeverine Hydrochloride, Propylthiouracil, Quinidine Sulfate, and Topiramate Oral Suspensions in SyrSpend SF PH4. Int J Pharm Compd. 2017;21:339-346.
22. Uriel M, Gómez-Rincón C, Marro, D. Stability of regularly prescribed oral liquids formulated with SyrSpend® SF. Die Pharmazie. 2018; 73:196-201.
23. Barbezat C, Le Daré B, Lester MA and Boivin PN. Etude de stabilité d'une suspension buvable de cloxacilline à usage pédiatrique. Poster presentation at 11th Rencontres Convergences Santé Hôpital 2016.
24. Bellay R, Lesourd F, Quillec C, Gicquel T, Boivin PN and Lester MA. Stabilité dune suspension buvable de nitrendipine 5 mg/mL. Poster presentation at 11th Rencontres Convergences Santé Hôpital 2016.
25. Bonnaure AC, Bellay R, Rault P, Lester MA and Boivin PN. Stability study of 5 mg/ml pediatric prednisone oral suspension in SyrSpend® SF ALKA. 20th European GERPAC Conference 2017.
26. Boivin P, Geffroy C, Tron C, el al PP-054 Stability study of 100 mg/ml paediatric pyrazinamide oral suspension in syrspend. Eur J Hosp Pharm 2017;24:A225.
27. Guillois G, Fetigue L, Perovic I, et al PP-028 Stability study of 1 mg/ml paediatric warfarin oral suspension in syrspend. Eur J Hosp Pharm 2017;24:A214.

SyrSpend® SF

Πίνακας συμβατότητας